



执业药师考试

《中药学专业知识(二)》模拟真题

一、单项选择题（每题 1 分）

第 1 题

若提取药材中的原生苷，除了采用沸水提取外，还可以选用（）

- A.热乙醇
- B.氯仿
- C.乙醚
- D.冷水
- E.酸水

正确答案：A,

第 2 题

温郁金药材的来源是（）

- A.姜科植物温郁金
- B.鸢尾科植物温郁金
- C.姜科植物姜黄
- D.姜科植物广西莪术
- E.鸢尾科植物蓬莪术

正确答案：A,

第 3 题

中药五味子中所含的主要木脂素是（）

- A.简单木脂素
- B.单氧环木脂素
- C.环木脂内酯木脂素
- D.联苯环辛烯型木脂素
- E.新木脂素



正确答案：D,

第 4 题

斑蝥背部革质鞘翅的特点是（）

- A.黑色，具白色条纹
- B.黑色，有 3 条黄色或棕黄色的横纹
- C.乌黑色，具红色条纹
- D.黄色，有 3 条黄色纵条纹
- E.乌黑色，具红色斑点

正确答案：B,

第 5 题

生物碱多存在于（）

- A.单子叶植物
- B.双子叶植物
- C.蕨类植物
- D.裸子植物
- E.藻类植物

正确答案：B,

第 6 题

狗脊表面可见（）

- A.光亮的金黄色茸毛
- B.毛刺
- C.隆起的棱线
- D.纵皱纹
- E.鳞片

正确答案：A,

第 7 题

以木脂素为主要有效成分的药材是（）

- A.葶苈子
- B.木瓜
- C.五味子
- D.山楂
- E.苦杏仁

正确答案：C,



第 557 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:中药鉴定学部分 > 单项选择题 >

牛膝药材薄层色谱鉴别的对照品是 ()

- A.牛膝甾酮
- B.三萜皂苷
- C. β -脱皮甾酮
- D.甾酮
- E.齐墩果酸

正确答案: C,

第 9 题

鉴别黄酮类化合物最常用的反应是 ()

- A.反应
- B.锆盐-枸橼酸反应
- C.反应
- D.氨性氯化锶反应
- E.HCl-Mg 粉反应

正确答案: E,

第 10 题

平贝母的幼小鳞茎常用来冒充 ()

- A.浙贝
- B.青贝
- C.炉贝
- D.松贝
- E.珠贝

正确答案: D,

第 11 题

根和根茎类药材的采收期一般为 ()

- A.春季
- B.夏季
- C.春夏之交
- D.秋冬及春初发芽前或刚露苗时
- E.全年均可

正确答案: D,



第 12 题

狗脊表面 ()

- A.被粗刺
- B.被光亮的金黄色茸毛
- C.被棱线
- D.被硬毛
- E.密被排列整齐的叶柄残基及鳞片

正确答案：B,

第 13 题

软紫草的原植物为 ()

- A.新疆紫草
- B.紫草
- C.内蒙紫草
- D.滇紫草
- E.云南紫草

正确答案：A,

第 14 题

钠化合物类药材是 ()

- A.石膏
- B.赭石
- C.芒硝
- D.炉甘石
- E.自然铜

正确答案：C,

第 15 题

母核不属于五环三萜的化合物 ()

- A.人参皂苷 Rgl
- B.甘草酸
- C.熊果酸
- D.人参皂苷 Ro
- E.齐墩果酸

正确答案：A,

第 16 题



粉末中含有石细胞、油细胞、黏液细胞、纤维及草酸钙针晶的药材是（）

- A.黄柏
- B.厚朴
- C.秦皮
- D.杜仲
- E.肉桂

正确答案：E,

第 17 题

药典规定麻黄含生物碱以盐酸麻黄碱计算不得少于（）

- A.0. 4%
- B.0. 5%
- C.0. 6%
- D.0. 8%
- E.1. 0%

正确答案：E,

第 18 题

来源于棕榈科的药材是（）

- A.乳香
- B.血竭
- C.阿魏
- D.安息香
- E.苏合香

正确答案：B,

第 19 题

麦冬药材主含（）

- A.皂苷和黄酮
- B.生物碱
- C.蒽醌
- D.木脂素
- E.环烯醚萜

正确答案：A,

第 20 题

在 UV 中，带 II 很强为主峰，带 I 很弱为主峰长波方向处一个肩峰的化合物是（）

关注微信订阅号：yaoshiv，获取海量复习资料



- A.山柰酚
 - B.杨梅素
 - C.木犀草素
 - D.槲皮素
 - E.杜鹃素
- 正确答案：E,

中药师QQ群：291876905