



执业西药师考试模拟题

《药学专业知识（二）》

一、最佳选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 老年人对苯二氮革类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

- A. 震颤麻痹综合征
- B. 老年期痴呆
- C. “宿醉”现象
- D. 戒断综合征
- E. 锥体外系反应

答案:1.C

2. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍药的是

- A. 吡拉西坦片
- B. 胞磷胆碱
- C. 利斯的明
- D. 多奈哌齐
- E. 石杉碱甲

答案:2.A

3. 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

- A. 二甲双胍
- B. 辛伐他汀
- C. 米氮平
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

答案:3.C

4. 可以降低血尿酸水平，但升高尿酸水平而易导致肾结石的抗痛风药是

- A. 秋水仙碱
- B. 别嘌醇
- C. 丙磺舒
- D. 呋塞米



E. 布洛芬

答案:4.C

5. 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是

- A. 秋水仙碱
- B. 二马氟尼
- C. 苯溴马隆
- D. 别嘌醇
- E. 阿司匹林

答案:5.A

6. 患者，女，45岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A. 硝苯地平
- B. 双氯芬酸钠
- C. 雷尼替丁
- D. 格列齐特
- E. 二甲双胍

答案:6.B

7. 哮喘急性发作应用平喘药，最适宜的给药途径是

- A. 吸入给药
- B. 口服给药
- C. 静脉滴注
- D. 肌肉注射
- E. 透皮给药

答案:7.A

8. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A. 左氧氟沙星
- B. 羧甲司坦
- C. 泼尼松龙
- D. 多索茶碱
- E. 右美沙芬

答案:8.B



9. 需要嚼碎服用的药品是

- A. 泮托拉唑肠溶片
- B. 胰酶肠溶片
- C. 乳酸菌素片
- D. 胶体果胶铋胶囊
- E. 法莫替丁片

答案:9.C

10. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A. 动脉粥样硬化
- B. 应激性大出血
- C. 血小板减少症
- D. 骨质疏松性骨折
- E. 胃食管反流病

答案:10.D

11. 不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是

- A. 氢氧化铝
- B. 三硅酸镁
- C. 碳酸钙
- D. 铝碳酸镁
- E. 硫糖铝

答案:11.D

12. 妊娠期高血压妇女宜选用的药品是

- A. 福辛普利
- B. 利血平
- C. 厄贝沙坦
- D. 阿利克仑
- E. 甲基多巴

答案:12.E

13. 具有肺毒性和光过敏反应的抗心律失常药是

- A. 普罗帕酮
- B. 美西律
- C. 地尔硫革
- D. 维拉帕米



E. 胺碘酮

答案:13.E

14. 用于低分子肝素过量时解救的药品是

- A. 氨甲环酸
- B. 酚磺乙胺
- D. 鱼精蛋白
- C. 维生素 K₁
- E. 血凝酶

答案:14.D

15. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A. 阿替普酶
- B. 瑞替普酶
- C. 尿激酶
- D. 链激酶
- E. 降纤酶

答案:15.D

16. 服用华法林，应当每日监测凝血指标，将国际标准化比值（INR）目标控制在

- A. 2.0~3.0
- B. 3.0~4.0
- C. 4.0~5.0
- D. 5.0~6.0
- E. 7.0~8.0

答案:16.A

17. 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的抗凝药是

- A. 依诺肝素
- B. 肝素
- C. 华法林
- D. 利伐沙班
- E. 达比加群酯

答案:17.D

18. 长期使用可使血钾水平升高的药品是



- A. 氨苯蝶啶
- B. 呋塞米
- C. 呋达帕胺
- D. 乙酰唑胺
- E. 氢氯噻嗪

答案:18.A

19. 属于糖皮质激素禁忌证的是

- A. 严重高血压
- B. 过敏性皮炎
- C. 再生障碍性贫血
- D. 类风湿性关节炎
- E. 血管神经性水肿

答案:19.A

20. 服用时必须保持坐位或立位、空腹，服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是

- A. 依降钙素
- B. 依普黄酮
- C. 雷洛昔芬
- D. 阿仑膦酸钠
- E. 阿法骨化醇

答案:20.D