



## 执业西药师考试模拟题

配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意）

**【41-42】**

- A. 胆绞痛
- B. 低血压
- C. 便秘
- D. 躁狂
- E. 多汗

41. 阿片类镇痛药与阿托品合用，可抑制胃肠蠕动，导致的不良反应是

答案:41. C

42. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是

答案:42. B

**【43-45】**

- A. 阿米替林
- B. 氟西汀
- C. 吗氯贝胺
- D. 文拉法辛
- E. 米氮平

43. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

答案:43. B

44. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是

答案:44. C

45. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

答案:45. D

**【46-47】**

- A. 沙美特罗
- B. 孟鲁司特
- C. 多索茶碱
- D. 布地奈德
- E. 噻托溴铵

46. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

答案:46. C



47. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

答案:47. B

【48-49】

- A. 多索茶碱
- B. 孟鲁司特
- C. 沙美特罗
- D. 噻托溴铵
- E. 沙丁胺醇

48. 可与吸人性糖皮质激素合用的长效 $\beta_2$ 受体激动剂是

答案:48. C

49. 可与吸人性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

答案:49. D

【50-52】

- A. 法莫替丁
- B. 多潘立酮
- C. 氯苯那敏
- D. 奥美拉唑
- E. 莫沙必利

50. 属于多巴胺  $D_2$  受体阻断剂的是

答案:50. B

51. 属于选择性 5-HT<sub>4</sub> 受体激动剂的是

答案:51. E

52. 属于组胺 H<sub>2</sub> 受体阻断剂的是

答案:52. A

【53-55】

- A. 甘油（开塞露）
- B. 聚乙二醇 4000
- C. 乳果糖
- D. 酚酞
- E. 硫酸镁

53. 属于刺激性泻药的是

答案:53. D

54. 属于润滑性泻药的是

答案:54. A



55. 属于膨胀性泻药的是

答案:55. B

【56-58】

A. 每次 1mg

B. 每次 2.5mg

C. 每次 4mg

D. 每次 5mg

E. 每次 12.5mg

56. 氨氯地平用于高血压的初始剂量是

答案:56. D

57. 拉西地平用于高血压的初始剂量是

答案:57. C

58. 卡托普利用于高血压的初始剂量是

答案:58. E

【59-60】

A. 硝酸甘油

B. 利多卡因

C. 氨氯地平

D. 氯沙坦

E. 美托洛尔

59. 可阻断 $\beta$ 受体，用于治疗房性及室性心律失常的药品是

答案:59. E

60. 可阻滞钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

答案:60. B