



执业西药师考试模拟题

综合分析选择题（共 10 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

【101-103】

患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

101. 该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外，还应监测的指标是

- A. 血钾
- B. 血钠
- C. 血钙
- D. 血氯
- E. 血镁

答案:101. A

102. 该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是

- A. 低血糖
- B. 光过敏
- C. 干咳
- D. 水肿
- E. 口干

答案:102. C

103. 服药 2 个月后，血压控制未达标，经进一步检查，该患者伴同型半胱氨酸水平升高，宜联合应用的药品是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B₆
- C. 维生素 C
- D. 烟酸
- E. 叶酸

答案:103. E

【104-106】



患者，男，66岁。体检发现血糖高前来就诊，有磺胺药过敏史，体型肥胖。医师处方二甲双胍片（0.5g，tid）控制血糖。

104. 二甲双胍片的适宜服用时间是

- A. 餐前半小时
- B. 随餐服用
- C. 餐后半小时
- D. 餐后2小时
- E. 空腹服用

答案:104. B

105. 该患者复诊发现糖耐量异常及餐后血糖升高，单药控制未达标，建议联合应用的降糖药是

- A. 格列喹酮
- B. 格列本脲
- C. 胰岛素
- D. 阿卡波糖
- E. 罗格列酮

答案:105. D

106. 联合用药应注意监测的主要不良反应是

- A. 光敏反应
- B. 低血糖反应
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 急性胰腺炎
- E. 尿路感染

答案:106. B

【107-110】

患者，女，70岁。拟行膝关节置换术，无磺胺类药物过敏史，皮试结果呈阴性。体征和实验室检查：低热，无感染，空腹血糖 4.6mmol/L，血常规白细胞计数 $6.0 \times 10^9/L$ 。手术医师处方抗菌药物预防感染。

107. 首选的抗菌药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 头孢唑林
- C. 万古霉素
- D. 克林霉素
- E. 磺胺嘧啶



答案:107. B

108. 围手术期预防性用药宜采用的给药途径是

- A. 口服
- B. 肌内注射
- C. 静脉滴注
- D. 皮下注射
- E. 动脉注射

答案:108. C

109. 围手术期预防性用药的起始给药时机是

- A. 术前 24 小时
- B. 术前 0.5~2 小时
- C. 术中
- D. 术后 0.5~2 小时
- E. 术后 24 小时

答案:109. B

110. I 类清洁手术切口预防性应用抗菌药物的比例不得超出手术病例总数的

- A. 70%
- B. 60%
- C. 50%
- D. 40%
- E. 30%

答案:110. E

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 服用非甾体抗炎药所致胃黏膜溃疡或出血的机制有

- A. 抑制前列腺素合成，使胃黏膜失去保护作用
- B. 破坏胃黏膜保护屏障，直接损伤胃黏膜
- C. 促进胃内容物和胃酸反流进入食管中
- D. 抑制肝脏凝血酶原和凝血因子 X 合成途径
- E. 减少内皮细胞增生，减少溃疡床血管形成

答案:111. ABDE

112. 促胃肠动力药在应用中可致的典型不良反应有



- A. 高泌乳素血症
- B. 类磺胺药过敏反应
- C. 锥体外系反应
- D. 5-羟色胺综合征
- E. 尖端扭转型室性心律失常

答案:112. ACE

113. 患者, 男, 59 岁, 诊断为急性心绞痛, 医生处方硝酸甘油片, 舌下含服, 药师应交代的注意事项包括

- A. 服药时尽量采取坐、卧位
- B. 口腔黏膜干燥者先用水润湿口腔后再含服
- C. 服药后可能出现头痛、面部潮红
- D. 咳嗽是典型的不良反应
- E. 15 分钟内重复给药 3 次, 症状仍不能缓解, 应及时就医

答案:113. ABCE

114. 临床常用的促凝血药的类别包括

- A. 促凝血因子合成药
- B. 促凝血因子活性药
- C. 促纤维蛋白溶解药
- D. 影响血管通透性药
- E. 血管紧张素转换酶抑制药

答案:114. ABD

115. 与其他抗凝药相比, 凝血因子 Xa 直接抑制剂具有的药理作用特点包括

- A. 作用直接、选择性高
- B. 血浆半衰期较长
- C. 治疗窗宽, 无需监测 INR
- D. 肾功能不全者使用后出血率低
- E. 抗凝作用强且不影响已形成的凝血酶活性

答案:115. ABCDE

116. 糖皮质激素的禁忌证包括

- A. 活动性消化性溃疡
- B. 严重精神病或癫痫
- C. 严重 2 型糖尿病
- D. 未能控制的细菌、病毒或真菌感染



E. 系统性红斑狼疮

答案:116. ABCD

117. 在电解质紊乱（低血钾、低血镁）下服用，易引发尖端扭转型室性心律失常的药品有

- A. 阿司咪唑
- B. 利培酮
- C. 西沙必利
- D. 奎尼丁
- E. 双嘧达莫

答案:117. ABCD

118. 可以抑制细菌核糖体 50S 亚单位，阻碍细菌蛋白质合成的抗菌药物有

- A. 林可霉素类
- B. 大环内酯类
- C. 头孢菌素类
- D. 酰胺醇类（氯霉素）
- E. 氨基糖苷类

答案:118. ABD

119. 可引起“双硫仑样”反应，服药期间禁止饮酒的抗菌药物有

- A. 头孢哌酮
- B. 甲硝唑
- C. 呋喃妥因
- D. 磷霉素
- E. 头孢他啶

答案:119. ABC

120. 对重度致吐化疗药所引起的恶心、呕吐，可选择的治疗药品有

- A. 昂丹司琼
- B. 地塞米松
- C. 阿瑞吡坦
- D. 多西他赛
- E. 托瑞米芬

答案:120. ABC