



执业药师考试

《药专业知识（一）》模拟真题

单项选择题（每题 1 分）

第 21 题

胰岛素不会引起

- A. 过敏反应 B. 低血糖 C. 脂肪萎缩 D. 酮血症 E. 胰岛素抵抗

正确答案：D,

第 22 题

抗菌谱和药理作用特点均类似于第三代头孢菌素的药物是

- A. 头孢孟多 B. 头孢氨苄
C. 氨曲南 D. 拉氧头孢 E. 头孢吡肟

正确答案：D,

第 23 题

对绿脓杆菌有较强作用的药物是

- A. 氯唑西林 B. 美西林
C. 阿莫西林 D. 哌拉西林 E. 替莫西林

正确答案：D,

第 24 题

主要用于疟疾病因性预防的药物是

- A. 乙胺嘧啶 B. 奎宁
C. 氯喹 D. 青蒿素 E. 伯氨喹

正确答案：A,



第 25 题

用于评价制剂吸收的主要指标是

A. K B. Cl C. $t_{1/2}$ D. Vd E. F

正确答案：E,

第 26 题

反映药物在体内分布广窄程度的指标是

A. K B. Cl C. $t_{1/2}$ D. Vd E. F

正确答案：D,

第 27 题

对 β 受体有阻滞作用的药物是

A. 可乐定 B. 哌唑嗪 C. 普萘洛尔 D. 琥珀胆碱 E. 去甲肾上腺素

正确答案：C,

第 28 题

对 α_1 和 α_2 受体均有激动作用的药物是

A. 可乐定 B. 哌唑嗪 C. 普萘洛尔 D. 琥珀胆碱 E. 去甲肾上腺素

正确答案：E,

第 29 题

对 α_1 受体有选择性阻滞作用的药物是

A. 可乐定 B. 哌唑嗪 C. 普萘洛尔 D. 琥珀胆碱 E. 去甲肾上腺素

正确答案：B,

第 30 题

对 α_2 受体有选择性激动作用的药物是

A. 可乐定 B. 哌唑嗪 C. 普萘洛尔 D. 琥珀胆碱 E. 去甲肾上腺素

正确答案：A,

第 31 题

缩短快动眼睡眠时相，突然停药可出现戒断症状的药物是

A. 水合氯醛 B. 硫喷妥钠 C. 苯巴比妥 D. 地西泮 E. 格鲁米特

正确答案：C,

第 32 题

对快动眼睡眠时相影响小，停药时“反跳”不明显的药物是



A. 水合氯醛 B. 硫喷妥钠 C. 苯巴比妥 D. 地西洋 E. 格鲁米特
正确答案：D,

第 33 题

不缩短快动眼睡眠时相，醒后无明显不适的药物是

A. 水合氯醛 B. 硫喷妥钠 C. 苯巴比妥 D. 地西洋 E. 格鲁米特
正确答案：A,

第 34 题

对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍可有效的药物是

A. 苯妥英钠 B. 卡马西平 C. 丙戊酸钠 D. 乙琥胺 E. 氯硝西洋
正确答案：C,

第 35 题

尤其适用于伴有精神症状的儿童癫痫患者的药物是

A. 苯妥英钠 B. 卡马西平 C. 丙戊酸钠 D. 乙琥胺 E. 氯硝西洋
正确答案：B,

第 36 题

几乎无锥体外系反应的药物是

A. 氯丙嗪 B. 氯氮平 C. 氟哌啶醇 D. 利培酮 E. 珠氯噻醇
正确答案：B,

第 37 题

锥体外系副作用发生率高，程度严重的药物是

A. 氯丙嗪 B. 氯氮平 C. 氟哌啶醇 D. 利培酮 E. 珠氯噻醇

正确答案：C,

第 38 题

能诱发癫痫的药物是

A. 氯丙嗪 B. 氯氮平 C. 氟哌啶醇 D. 利培酮 E. 珠氯噻醇

正确答案：A,

第 39 题

治疗剂量吗啡即可引起的不良反应是

关注微信订阅号：yaoshiv，获取海量复习资料



A. 恶心、呕吐、便秘 B. 耐受性和依赖性 C. 血压升高 D. 呼吸肌麻痹 E. 呼吸急促
正确答案：A,

第 40 题

连续反复应用吗啡可引起的不良反应是

A. 恶心、呕吐、便秘 B. 耐受性和依赖性 C. 血压升高 D. 呼吸肌麻痹 E. 呼吸急促
正确答案：B,

西药师QQ群：290551102