



执业药师考试 模拟真题

- 1、关于药物制剂配伍变化的错误叙述为（ ）。
- A. 配伍变化包括物理、化学与药理学方面的变化
 - B. 药理学方面的配伍变化又称为疗效配伍变化
 - C. 药物配伍后在体内相互作用，产生不利于治疗的变化，属于疗效配伍禁忌
 - D. 物理配伍变化往往导致制剂出现产气现象
 - E. 易产生物理配伍变化的药物制剂若改变制备条件可防止配伍变化的发生

1. D
- 2、防止药物氧化的措施有（ ）。

- A. 驱氧
- B. 制成液体制剂
- C. 加入抗氧剂
- D. 加金属离子络合剂
- E. 控制温度

2、AC

- 3、临床前药理毒理学研究包括（ ）。

- A. 主要药效学研究
- B. 一般药理学研究
- C. 药代动力学研究
- D. 毒理学研究
- E. I 期临床试验

3、ABCD

- 4、烷化剂类抗肿瘤药物与 DNA 中鸟嘌呤碱基键合形式是（ ）。

- A. 范德华力
- B. 疏水性相互作用
- C. 共价键
- D. 偶极-偶极作用



E. 静电引力

4、C

5、烯烃类药物的体内代谢，一般通过烯烃氧化（ ）。

- A. 生成 N-氧化物
- B. 生成 N-羟基化合物
- C. 生成环氧化物
- D. 生成醛和羧酸
- E. 生成 ω -羟基或 $\omega-1$ 羟基化合物

5、C

6、成瘾性镇痛药过量处理的说法，正确的是（ ）。

- A. 距口服给药时间 4~6h 内应即洗胃
- B. 距口服给药时间 6~8h 内应即洗胃
- C. 距口服给药时间 8~12h 内应即洗胃
- D. 注射给药后出现危象，可静脉注射纳洛酮，必要时重复给药
- E. 注射给药后出现危象，不可静脉注射纳洛酮，以防发生不良反应

6、ABCD。解析：此题主要考查本题考查吗啡典型不良反应，常见呼吸抑制、支气管痉挛、少见瞳孔缩小、黄视，注射剂连续应用 3~5 日即产生身体和精神依赖性，抗利尿作用以吗啡最为明显，兼有输尿管痉挛时，可出现少尿、尿频、尿急和排尿困难。

7、7、与阿片受体阻断剂合用，可出现戒断综合征的是（ ）。

- A. 苯丙哌林
- B. 可待因
- C. 右美沙芬
- D. 喷托维林
- E. 甘草合剂

7、BC

8、下列哪些属于祛痰药（ ）。

- A. 氨溴索
- B. 氨茶碱
- C. 乙酰半胱氨酸



- D. 右美沙芬
- E. 羧甲司坦

8、ACE

9、哮喘急性发作应用平喘药，最适宜的给药途径是（ ）。

- A. 吸入给药
- B. 口服给药
- C. 静脉滴注
- D. 肌肉注射
- E. 透皮给药

9、A。解析：此题主要考查对于哮喘急性发作，最适宜的给药方式是吸入给药，从而直接松弛支气管平滑肌缓解哮喘症状

10、10、通过阻断 H₂ 受体而抑制胃酸分泌的药物是（ ）。

- A. 苯海拉明
- B. 雷尼替丁
- C. 氯苯那敏
- D. 阿司咪唑
- E. 奥美拉唑

11、10、B。解析：此题主要考查雷尼替丁属于组胺 H₂ 受体阻断剂，通过阻断 H₂ 受体而抑制胃酸分泌。