



执业药师考试

《药专业知识（一）》模拟真题

单项选择题（每题 1 分）

第 1 题

副作用是由于

- A. 药物剂量过大而引起的
- B. 用药时间过长而引起的
- C. 药物作用选择性低、作用较广而引起的
- D. 过敏体质引起
- E. 机体生化机制的异常所致

正确答案：C,

第 2 题

葡萄糖的主要转运方式

- A. 属于简单扩散
- B. 属于被动转运
- C. 属于主动转运
- D. 属于滤过
- E. 需要特殊的载体



正确答案：E,

第 3 题

药物与血浆蛋白结合后，药物

- A. 作用增强 B. 代谢加快 C. 转运加快 D. 排泄加快 E. 暂时失去药理活性

正确答案：E,

第 4 题

与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

- A. 中枢镇静作用较强
B. 对有机磷中毒解救作用强
C. 对眼的作用强
D. 对胃肠道平滑肌作用强
E. 对心脏作用强

正确答案：A,

第 5 题

能引起心率加快、收缩压上升、舒张压下降的药物是

- A. 去氧肾上腺素
B. 酚妥拉明
C. 肾上腺素
D. 去甲肾上腺素
E. 普萘洛尔

正确答案：C,

第 6 题

普萘洛尔属于

- A. 选择性 β_1 受体阻断药 B. 非选择性 β 受体阻断药
C. 选择性 α 受体阻断药 D. 非选择性 α 受体阻断药 E. α 、 β 受体阻断药

正确答案：B,



第 7 题

利多卡因

- A. 对室上性心律失常有效
- B. 可口服，也可静脉注射
- C. 肝脏代谢少，主要以原形经肾排泄
- D. 属于 Ic 类抗心律失常药
- E. 为急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药

正确答案：E,

第 8 题

巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是

- A. 肝脏损害
- B. 循环衰竭
- C. 深度呼吸抑制
- D. 昏迷
- E. 继发感染

正确答案：C,

第 9 题

丙戊酸钠的严重毒性是

- A. 肝功能损害
- B. 再生障碍性贫血
- C. 抑制呼吸
- D. 口干、皮肤干燥
- E. 低血钙

正确答案：A,

第 10 题

氯丙嗪引起的迟发性运动障碍的精神分裂症患者宜选用的药物是

- A. 氟哌啶醇
- B. 氟哌利多
- C. 三氟哌多
- D. 氯普噻吨
- E. 氯氮平

正确答案：E,

第 11 题

可用于治疗肝昏迷，但不能改善肝功能的药物是

- A. 金刚烷胺
- B. 左旋多巴
- C. 卡比多巴
- D. 苯海索
- E. 司来吉兰

正确答案：B,



第 12 题

关于哌替啶药理作用叙述中正确的是

- A. 镇痛镇静作用较吗啡弱
- B. 可引起便秘, 并有止泻作用
- C. 对妊娠末期子宫, 有抗催产素作用
- D. 不扩张血管, 不引起体位性低血压
- E. 提高胆道压力作用较吗啡强

正确答案: A,

第 13 题

维拉帕米的药理作用是

- A. 促进 Ca^{2+} 内流
- B. 增加心肌收缩力
- C. 直接抑制 Na^{+} 内流
- D. 降低窦房结和房室结的自律性
- E. 升高血压

正确答案: D,

第 14 题

关于强心苷的叙述, 正确的是

- A. 其极性越大, 口服吸收率越高
- B. 强心苷的作用与交感神经递质及其受体有关
- C. 具有正性频率作用
- D. 安全范围小, 易中毒
- E. 可用于室性心动过速

正确答案: D,

第 15 题

通过阻断血管紧张素 II 受体而治疗慢性心功能不全的药物是

- A. 地高辛
- B. 氨力农
- C. 卡托普利
- D. 美托洛尔
- E. 氯沙坦

正确答案: E,

第 16 题

硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A. 阻断 β 受体
- B. 直接作用于血管平滑肌
- C. 促进前列环素的生成
- D. 使一氧化氮产生增加
- E. 阻滞 Ca^{2+} 通道

正确答案: D,

第 17 题

关于噻嗪类利尿药, 叙述错误的是

- A. 痛风患者慎用
- B. 糖尿病患者慎用



C. 可引起低钙血症 D. 肾功能不良者禁用 E. 可引起血氨升高
正确答案：C,

第 18 题

肝素的抗凝作用特点是

A. 作用缓慢 B. 体内、体外均有效 C. 仅在体外有效 D. 仅在体内有效 E. 必须有维生素 K 辅助

正确答案：B,

第 19 题

属于保钾利尿药的是

A. 氢氯噻嗪 B. 螺内酯 C. 甘露醇 D. 呋塞米 E. 乙酰唑胺

正确答案：B,

第 20 题

奥美拉唑的主要作用机制是

A. 阻断 H_2 受体 B. 中和胃酸
C. 灭活 H^+-K^+-ATP 酶 D. 促进胃黏液分泌 E. 覆盖于胃黏膜上，阻断胃酸作用

正确答案：C,